

Ta karta powinna zawsze znajdować się przy pacjencie/ dziecku/ jego opiekunie.

Należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego przed rozpoczęciem leczenia.

Informacja dla pacjentów/ opiekunów

- Lek Vyselik należy przyjmować/ podawać regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia porannej dawki należy przyjąć/ podać kapsułkę od razu, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni i może być przyjęta/ podana jednocześnie z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/ podać wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować/ podawać dwóch dawek następnego dnia rano, zamiast tego należy kontynuować przyjmowanie/ podawanie leku następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.

- Nie należy przerywać stosowania/ podawania leku Vyselik bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia u pacjenta udaru mózgu/ zakrzepu krwi lub innych powikłań.
- Lek Vyselik pomaga w rozrzedzaniu krwi. Jednakże może to zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień obejmują zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, bladość lub osłabienie, nagły, silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.



Karta ostrzeżeń dla Pacjenta Vyselik (apiksaban)

CELON
P H A R M A

- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakiegokolwiek zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Vyselik.

Leczę się przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku Vyselik (apiksaban) w celu zapobiegania zakrzepów krwi.

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Lek Vyselik (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Lek Vyselik może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.

- Leczenie lekiem Vyselik nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagły zabieg chirurgiczny (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)) – patrz ChPL.
- Dla osób dorosłych dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowany przeciw czynnikowi Xa jednak nie ustalono jego bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (patrz charakterystyka produktów leczniczych dla andeksanetu alfa).

Należy uzupełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Masa ciała: Dawka: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza: